

BRASMAX FÚRIA CE

65K67 RSF CE



BRASMAX
T E M R E N D I M E N T O

LANÇAMENTO

Pontos Fortes

Alto potencial produtivo

Excelente adaptação às regiões de menor altitude

Ampla região de adaptação

Resistência à podridão radicular de Phytophthora (raça 1)

Características Agronômicas

Grupo de Maturidade	6.5	
Altura da Planta	Alta	
Hábito de Crescimento	Indeterminado	
Peso de 1000 sementes (g)	150	
Cor	Flor	Roxa
	Hilo	Preto Imperfeito
	Pubescência	Cinza

Reação à Doenças

	S	MS	MR	R	S.I
Pústula Bacteriana					●
Cancro da Haste					●
Podridão Rad. Phytophthora				1	
Oídio					●
Nematóide Cisto					●

Recomendações de Cultivo (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 2 200mil a 340mil

Época de Semeadura

Época de semeadura	micro ciclo médio (dias) ¹		SET	OUT	NOV	DEZ	população (plantas finais)
			01 10 20	01 10 20	01 10 20	01 10 20	
MS Arenito	202	112	█	█	█	█	220 - 320
Sul (sequeiro)	206	112	█	█	█	█	220 - 320
Oeste	207	112	█	█	█	█	220 - 320
PR Oeste (abaixo 500m altitude)	201	125	█	█	█	█	220 - 320
Oeste (acima 500m altitude)	201	134	█	█	█	█	200 - 280
Arenito	202	112	█	█	█	█	220 - 320
Centro (abaixo 600m altitude)	203	116	█	█	█	█	220 - 320
Centro (acima 600m altitude)	203	124	█	█	█	█	200 - 300
Norte (abaixo 600m altitude)	203	116	█	█	█	█	220 - 320
Norte (acima 600m altitude)	203	124	█	█	█	█	200 - 300
SP Arenito	202	112	█	█	█	█	240 - 340
Sudoeste (abaixo 600m altitude)	203	116	█	█	█	█	220 - 320
Sudoeste (acima 600m altitude)	203	124	█	█	█	█	200 - 300
Centro	204	116	█	█	█	█	240 - 340
Oeste	205	116	█	█	█	█	240 - 340

Região de Adaptação

